



くもまくか しゅつけつ クモ膜下出血

脳は外層から、硬膜、クモ膜、脳表にある軟膜の3層の膜で覆われている。
クモ膜と軟膜の間隙をクモ膜下腔といい、ここに出血をきたした状態である。
病因 脳動脈瘤、高血圧、もやもや病など
脳動脈瘤は主として脳底動脈の主幹分岐部に発生する。

好発年齢は、
50～70歳です
男性よりも女性が多いです



【症状】

ハンマーで殴られたような激しい頭痛 悪心、嘔吐、項部硬直
様々な程度の意識障害を伴い、急激に昏睡に陥ることもある。髄膜刺激症状を呈する。

【検査】


頭痛、悪心、嘔吐、項部硬直、ケルニツヒ徴候

CT 血腫は発症直後から高吸収域として描出でき、慢性期には低吸収域となる。

MRA、脳血管造影 脳動脈瘤の診断に行われる。

【合併症】

- 1 再破裂
- 2 脳血管攣縮
クモ膜下腔に出た血液が血管平滑筋を収縮させ、脳梗塞を起こす。
発症4～14日後に起こる可能性がある。
- 3 水頭症
脳脊髄液の循環が妨げられ、髄液が貯留し、脳室拡大が起こる。



【治療】

超急性期

意識レベルの観察、発症6時間以内は、血腫増大の可能性がある。

血圧管理、脳浮腫改善薬・止血薬・脳保護薬・脳代謝薬・抗潰瘍薬など

外科治療 開頭血腫除去術やCTガイド下の定位血腫吸引術を行い、頭蓋内を占拠した血腫を除去

急性期～慢性期

降圧療法、褥瘡予防、早期リハビリテーション

【予防】

高血圧症の治療 塩分制限 6g/日未満、減量 BMI25未満
動脈硬化の進行を遅くするため、生活習慣の改善を行う 脂質異常症の治療
脳のMRI検査 脳動脈硬化症の所見を調べる



【後遺症】

軽症、中等度、重症に分かれ、脳出血が発生した部位や範囲、年齢、健康状態に左右される
麻痺、手足のしびれ、言語障害、記憶力障害、感覚障害など様々な障害が残る可能性がある

InstagramのQRコードです

年に一度は健診を受けましょう!

健康診断

自分のため、家族のために
早期発見!



Instagram

@KAGAWA_CLINIC

フォローお願いします!

当院の情報は
ホームページからご覧頂けます。



医療法人社団 清明会
かがわクリニック



ホームページのQRコードです

診療時間	月	火	水	木	金	土	日
9:00～12:00	○	○	○	○	○	○	休診
15:00～18:00	○	○	×	○	○	×	休診

* 受付は15分前までにお願いします

かがわクリニック

検索

☎ 0790-43-8887

〒675-2322 兵庫県加西市北条町西高室
595-11